












Phụ lục: Thông tin các thuốc chống nấm/ kháng khuẩn dạng đặt âm đạo tại Nhà thuốc bệnh viện Từ Dũ dành cho phụ nữ mang thai


STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	Thông tin dành cho phụ nữ mang thai	HÌNH ẢNH
THUỐC KHÁNG NẤM				
1	Nanfizy 100mg	Natamycin 100mg	Dùng được cho phụ nữ mang thai	
2 3	Chimitol 500mg, Timbov 500mg	Clotrimazol 500mg	Không có bất kỳ bằng chứng có hại nào đối với phụ nữ có thai cũng như cho thai nhi khi sử dụng sản phẩm này. Trong thời kỳ mang thai, không nên dùng que đặt để đưa thuốc vào âm hộ, chỉ được dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ. Đặc biệt chú ý vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trong thời kỳ 4- 6 tuần cuối của thai kỳ.	
4 5	Lomexin Fentimeyer 1000	Fenticonazol nitrat (Lomexin: 200mg, Fentimeyer 1000: 1000mg)	Không có kinh nghiệm sử dụng trong thời kỳ mang thai. Nghiên cứu ở động vật cho thấy không có tác dụng quái thai, tác dụng gây độc phôi thai và thai nhi chỉ xảy ra ở liều rất cao qua đường uống. Tác động toàn thân của fenticonazole được cho là thấp khi sử dụng đường âm đạo. Tuy vậy, chỉ được dùng thuốc cho phụ nữ có thai dưới sự giám sát của bác sĩ	
6	Miko-penotran 1,2g	Miconazol nitrat 1200mg	Chống chỉ định đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu	

THUỐC CHỐNG NẤM VÀ KHÁNG KHUẨN

7	Fluomizin 10mg (*)	Dequalinium chlorid 10mg	Có thể dùng trong khi có thai	
8 9 10	Ponysta, Mydazol, Vagsur	Clindamycin 100mg Clotrimazol 100mg (Vagsur: Clindamycin 100mg, Clotrimazol 200mg)	Chưa có đủ số liệu nghiên cứu trên người mang thai 3 tháng đầu, chỉ dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ và theo dõi cẩn thận.	
11 12	Meclon, Metrima - M	Metronidazol 500mg Clotrimazol 100mg	Chỉ sử dụng trong thời gian mang thai khi thật cần thiết và phải theo dõi cẩn thận	

<p>13 14 15</p>	<p>Neo-penotran Itamelagin Vanober</p>	<p>Metronidazol 500mg Miconazol nitrat 100mg (Itamelagin bổ sung Lactobacillus acidophilus 10⁹ CFU)</p>	<p>Hết sức thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai, chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Sau 3 tháng đầu thai kỳ, có thể sử dụng trong những trường hợp bác sĩ cho là cần thiết, nhưng được dùng với sự kiểm soát</p>	 <p>The image shows three medicine boxes. The top left is Neo-Penotran (14 vaginal pessaries), the top right is Itamelagin (2 blisters x 5 suppositories), and the bottom is Vanober (2 blisters x 5 vaginal suppositories).</p>
<p>16</p>	<p>Safaria</p>	<p>Metronidazol 225mg Chloramphenicol 100mg Nystatin 75mg (330.000 IU)</p>	<p>Cloramphenicol chưa đủ nghiên cứu trên PNMT 3 tháng đầu, chỉ dùng khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ. Metronidazol qua nhau thai khá nhanh, được tỷ lệ giữa cuống nhau thai và huyết tương mẹ là 1:1. Chưa có thông báo về việc gây quái thai. Tuy nhiên, một số nghiên cứu thông báo nguy cơ sinh quái thai tăng khi dùng thuốc 3 tháng đầu thai kỳ. Do đó không nên dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ, trừ khi bắt buộc. Nystatin không có nguy cơ được thông báo.</p>	 <p>The image shows the Safaria medicine box (LTD FARMAPRIM) and a blister pack containing 10 vaginal suppositories.</p>
<p>17</p>	<p>Canvey</p>	<p>Metronidazol 225mg Chloramphenicol 100mg Nystatin 75mg (330.000 IU) Dexamethason acetat 0,5mg</p>	<p>Độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai chưa được thiết lập, do đó không nên dùng thuốc trong thời kỳ này</p>	 <p>The image shows the Canvey medicine box (Rx Prescription Drug) and a blister pack containing 5 vaginal suppositories.</p>

18	Neo-Penotran Forte L	Metronidazol 750mg Miconazol nitrat 200mg Lidocain 100mg	Chống chỉ định cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn cảm với các hoạt chất hoặc dẫn xuất của thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ Sau 3 tháng đầu thai kỳ, thuốc có thể được sử dụng trong những trường hợp bác sĩ cho là cần thiết, nhưng nên theo dõi.	
19	Polygynax (*)	Neomycin 35.000 IU Polymycin B 35.000 IU Nystatin 100.000 IU	Chưa có báo cáo lâm sàng về tác dụng phụ và độc tính khi sử dụng ở phụ nữ mang thai. Chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ.	
20	Neo-Tergynan Neometin	Metronidazol 500mg Nystatin 100.000 IU Neomycin sulfate 65.000 IU	Vì có chứa neomycin, có thể gây độc tính ở tai và đi vào máu, không nên sử dụng trong thời kỳ mang thai	
21	Ovumix	Metronidazol 300mg Miconazol nitrat 100mg Neomycin sulfat 48,8mg Polymycin B sulfat 4,4mg (26.400 IU) Gotu Kola 15mg	Chống chỉ định 3 tháng đầu thai kỳ.	

22	Clovucire	Metronidazol 500mg Clotrimazol 100mg Neomycin 56.000 IU	Chống chỉ định 3 tháng đầu của thai kỳ. Vì có chứa neomycin, có thể gây độc tính ở tai hoặc đi vào máu, không nên dùng trong thời kỳ mang thai	
----	------------------	---	--	---

Tài liệu tham khảo:

1. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, CDC 2015
2. Cơ sở dữ liệu Lexicomp
3. Dược thư quốc gia Việt Nam 2018
4. Thông tin kê toa sản phẩm