

## **XỬ TRÍ THAI THỨ HAI TRONG SONG THAI**

Trong song thai sau khi thai thứ nhất sỏ, thường có biến cố xảy ra với thai thứ hai. Có thể làm thai thứ hai xoay trong tử cung (TC), con co TC lại thưa, mẹ lại mệt mỏi vì đã gắng sức sinh thai thứ nhất. Vì thế, cần phải biết xử lý để bảo đảm an toàn cho mẹ và cho thai.

### **I. CÁC BƯỚC TIỀN HÀNH**

- Khám âm đạo kiểm ngay sau sỏ thai thứ nhất kiểm tra độ xóa mở cổ tử cung (CTC), ngôi, thế, kiểu thế của thai thứ hai.

- Nếu ngôi chỏm thì chờ đợi có con co TC rồi bấm ối và đỡ sinh như các trường hợp sinh ngôi chỏm.

- Ngôi bất thường (ngôi vai, ngôi trán, thai nhỏ) nội xoay thai và đại kéo thai. Sau đó, đỡ sinh ngôi mông hoặc đại kéo thai ngay.

- Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ để lấy nhau, nếu chảy máu có thể bóc nhau nhân tạo và soát lòng TC.

- Kiểm tra bánh nhau và màng nhau.

- Đề phòng băng huyết sau sinh (BHSS).

### **II. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TẠI BIẾN**

- Nếu buồng ối thứ hai bị vỡ đột ngột, thai trở thành ngôi vai, TC siết chặt vào thai, không thể làm thủ thuật nội xoay: phải phẫu thuật lấy thai.

- BHSS: xử trí theo phác đồ BHSS.