

## VIÊM ÂM ĐẠO DO TRICHOMONAS

Là một bệnh lây truyền qua đường tình dục và do trùng roi *Trichomonas vaginalis*.

### I. NGUYÊN NHÂN

Nhiễm *Trichomonas vaginalis*.

### II. CHẨN ĐOÁN

#### 2.1. Lâm sàng

- Huyết trắng nhiều, màu vàng hay xanh loãng, có bọt, có mùi tanh.
- Có thể ngứa, tiểu rát.
- Trường hợp nặng: có dấu hiệu trái dâu tây: âm đạo và cổ tử cung có những điểm xuất huyết nhỏ, lâm tām.

#### 2.2. Cận lâm sàng

- Soi tươi: trùng roi di động và nhiều bạch cầu.

### III. ĐIỀU TRỊ

- Metronidazole/Secnidazole/Tinidazole 2 g uống 1 liều duy nhất, hoặc
- Metronidazole 500 mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống trong bữa ăn).
- Lưu ý: luôn luôn điều trị cho bạn tình: Metronidazole 2 g uống 1 liều duy nhất.

- Không dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ.

### IV. THEO DÕI

- Tái khám khi có gì lạ.
- Khám phụ khoa định kỳ.