

DƯỢC LÂM SÀNG PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA

Ds. Hoàng Thị Vinh
Phòng Dược lâm sàng – Thông tin thuốc
Khoa Dược

1

I. TỔNG QUAN II. VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VI. KẾT LUẬN

2

I. TỔNG QUAN

- ⊙ Phòng khám phụ khoa dịch vụ
- ⊙ Phòng khám phụ khoa thường và bảo hiểm y tế
- ⊙ **Bệnh lý:** nhiễm khuẩn đường sinh dục, rong kinh, rong huyết, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, tầm soát và phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư âm hộ, âm đạo, tử cung ...
- ⊙ **Thuốc sử dụng:** thuốc nội tiết, thuốc kháng sinh, kháng nấm, thuốc bổ, thuốc rửa phụ khoa

3

II. VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ
 - 1.1. SỬ DỤNG AASTRID -S KIT/ FLASY KIT
 - 1.2. SỬ DỤNG CEFDINIR 300MG
 - 1.3. SỬ DỤNG METRONIDAZOL TRONG TRƯỜNG HỢP NHIỄM NẤM ÂM ĐẠO
2. SỬ DỤNG FLUCONAZOLE 150MG ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO NẤM CANDIDA

4

1. SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ

5

1.1. SỬ DỤNG AASTRID - S KIT/ FLASY KIT

• V.T.X, SN 1972, PARA 2002

Khám bệnh: AD khí hư đục CTC lỏng/dây vòng
TC: bt 2pp:bt

Chẩn đoán: Viêm AD/vòng

1. Flasy 2 kit chồng 04v
vợ 04v

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên

5. Wokadine 14 v

Đặt âm đạo 01 tối 1 viên

6. Gyfor 1 chai

Pha rửa âm hộ 1 lần

6

1.1. SỬ DỤNG AASTRID-S KIT/ FLASY KIT

N.M.N, 20 tuổi, độc thân

Khám : AD khí hư đục nhiều TR: TC + 2pp: Bình thường

Xét nghiệm: soi nhuộm

Chẩn đoán: V⁰ AD

Xử trí:

1. Astrid-S kit 04 v

Ngày uống 01 lần, mỗi lần 04 v

2. Femolbin 30 v

Ngày uống 01 lần, mỗi lần 01 v

6.Coligyno

Pha rửa âm hộ ngày 2-3 lần

7

1.1. SỬ DỤNG AASTRID - S KIT/ FLASY KIT

▪ Thành phần Astrid-S kit /Flasy kit:

Secnidazol 1g	02 viên	Uống liều duy nhất trong bữa ăn
Fluconazole 150mg	1 viên	Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn
Azithromycin 1g	1 viên	Uống 1h trước/2h sau ăn



1.1. SỬ DỤNG AASTRID - S KIT/ FLASY KIT

- Chỉ định: Nhiễm khuẩn âm đạo, candida âm đạo, nhiễm trùng roi âm đạo. Viêm nhiễm âm đạo ảnh hưởng sản sinh chất nhầy âm đạo. Nhiễm khuẩn sinh dục chưa biến chứng do *Chlamydia trachomatis* hoặc *Neisseria gonorrhoeae* không đa kháng.
- Aastrid - S kit/Flasy kit điều trị viêm đường sinh dục - tiết niệu do nhiều nguyên nhân khác nhau
- Điều trị dựa trên kết quả XN cận lâm sàng, theo từng nguyên nhân cụ thể?

9

1.2. SỬ DỤNG CEFDINIR 300MG

- T.T.T, SN 1979, PARA 2002
- Khám bệnh: AD khí hư đục CTC lảng
- TC: bt 2pp: mềm

Chẩn đoán: viêm AD

Xử trí:

- Trucal 30 v
- Ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 viên
- 2. Oricentri 300mg 5 v**
- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên
- VGA 14 viên
- Đặt AD mỗi tối 1 viên
4. Lagyné 1 chai
- Pha rửa AH ngày 1 lần

Oricentri 300 mg: Cefdinir 300mg
Cefalosporin thế hệ III

Viêm âm đạo, sử dụng Cefdinir 300mg?

10

1.3. SỬ DỤNG METRONIDAZOL TRONG TRƯỜNG HỢP VIÊM ÂM HỘ, ÂM ĐẠO DO NẤM

- H.T.H, PARA 3012, SN 1965
- AH: BT Đạo khí hư nhiều CTC: viêm đỏ
- TC: bt PP (P+ T): BT

Chẩn đoán: viêm âm hộ âm đạo do nấm

Xét nghiệm CLS: Pap's SẢ đầu dò

- Xử trí:
- 1. Canditral 100mg 12v (v+c)
2v x 1 lần/ngày
- 2. **Metronidazol 250mg 30v**
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên
- 3. Nizoral 1 tube bôi ngày 2 lần
- 4. Metronizol neo 10v
Đặt AD mỗi tối 1 viên
- 5. Bicarso 1 hộp
Pha rửa âm hộ 2 lần/ngày



Viêm âm đạo do nấm,
sử dụng Metronidazol?

11

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO

(Phác đồ điều trị sản - phụ khoa 2011, Bệnh viện Từ Dũ)

☞ **Nhiễm khuẩn âm đạo:**

- Metronidazole 500mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống trong bữa ăn), hoặc
- Metronidazole gel 5g/ngày x 5 ngày, hoặc
- Clindamycin 300mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống), hoặc
- Clindamycin 100mg x 1 lần/ngày x 3 ngày (đặt âm đạo)

12

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO

(Phác đồ điều trị sản - phụ khoa 2011, Bệnh viện Từ Dũ)

☞ Viêm âm đạo do Trichomonas:

- Metronidazole/ Secnidazole/Tinidazole 2g uống 1 liều duy nhất, hoặc
- Metronidazol 500mg x 2 lần/ngày trong 7 ngày (uống trong bữa ăn)

13

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO

(Phác đồ điều trị sản - phụ khoa 2011, Bệnh viện Từ Dũ)

☞ Viêm âm đạo do nấm Candida:

✓ Thuốc đặt âm đạo:

- Nystatin viên đặt âm đạo 100.000UI, 1 viên/ngày trong 14 ngày, hoặc
- Miconazol hoặc Clotrimazole viên đặt âm đạo 100mg, 1 viên/ngày trong 7 ngày, hoặc
- Miconazol hoặc Clotrimazole viên đặt âm đạo 200mg, 1 viên/ngày trong 3 ngày, hoặc
- Clotrimazole 500mg, đặt 1 liều duy nhất.

✓ Thuốc uống:

- Itraconazol 100mg uống 2 viên/ngày trong 3 ngày, hoặc
- Fluconazole 150mg uống 1 viên duy nhất.

✓ Thuốc bôi

Thuốc bôi kháng nấm ngoài da (vùng âm hộ) 7 ngày

14

2. SỬ DỤNG FLUCONAZOLE 150MG ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO – ÂM HỘ DO NẤM CANDIDA

15

VIÊM ÂM HỘ, ÂM ĐẠO DO NẤM

© L.T.T.T, PARA 1001, 26T, 10126BH

Ngày	Khám bệnh	Chẩn đoán và xử trí
26/07/2011	Ađ khí hư đục TC: thường di động CTC: viêm lộ tuyến 2PP: bình thường Pap's. Nhuộm (+)	Chẩn đoán: Viêm LTCTC + Nấm Xử trí: Fluconazole 150mg 3v (u) 3 tuần Natri bicarbonat 3 hộp TK 1 tháng
02/08/2011	KQ Pap's : TB viêm A Đ: khí hư đục CTC lóng TC & 2pp: BT	Chẩn đoán: Pkbt
07/10/2011	Tái khám A Đ khí hư lợn cợn CTC viêm đỏ TC & 2 pp: >bt	Chẩn đoán: Viêm âm đạo do nấm Xử trí: Canzole 12 viên 1 v (đặt AĐ) Povidine PK 1 chai rửa 2 lần /ngày TK 3 tháng

Phác đồ điều trị viêm âm hộ, âm đạo do Candida?

VIÊM ÂM HỘ, ÂM ĐẠO DO NẤM

- **Canzole** : Clotrimazole; Miconazole nitrate; Ornidazole
Chỉ định:
Nhiễm Candida âm đạo, nhiễm Trichomonas âm đạo, nhiễm khuẩn hỗn hợp tại âm đạo, viêm âm đạo do nhiễm khuẩn, huyết trắng do nhiễm khuẩn & nấm.

17

VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ DO NẤM



(STD Treatment Guideline 2010 –CDC)

18

VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ DO NẤM

Candida âm đạo, âm hộ không biến chứng:

- Đường uống: Fluconazole 150mg liều duy nhất
- Đường đặt/bôi:
 - Dạng bôi: Butoconazole/ Clotrimazole/ Tioconazole/Terconazole
 - Dạng đặt: Miconazole/Terconazole/Nystatin

19

VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ DO NẤM

- **Candida âm đạo, âm hộ có biến chứng:**
- *Candida âm đạo, âm hộ tái phát:*
 - Mỗi đợt tái phát đáp ứng tốt với điều trị đường uống ngắn ngày hoặc thuốc nhóm azole dùng tại chỗ.
 - Tuy nhiên, để kiểm soát tốt tình trạng bệnh, một số chuyên gia khuyến cáo điều trị tấn công dài ngày hơn (**7-14 ngày dùng tại chỗ hoặc dùng đường uống 100mg, 150mg, hoặc 200mg fluconazole mỗi 3 ngày, tổng cộng 3 liều**)

20

VIÊM ÂM ĐẠO, ÂM HỘ DO NẤM

- **Candida âm hộ có biến chứng:**
- *Candida âm hộ tái phát:*
 - Điều trị duy trì: Lựa chọn hàng đầu là **Fluconazole đường uống (100mg, 150mg hoặc 200mg) mỗi tuần trong 6 tháng.**
 - Trường hợp không thể thực hiện được phác đồ trên, có thể điều trị tại chỗ theo mỗi đợt tái phát.

21

VIÊM ÂM HỘ, ÂM ĐẠO DO NẤM

- **Candida âm hộ có biến chứng:**
- Nhiễm Candida âm đạo, âm hộ nặng: (viêm đỏ rộng âm hộ, phù, bong tróc da, và xuất hiện vết nứt) tỷ lệ đáp ứng lâm sàng thấp ở những bệnh nhân điều trị đường dùng tại chỗ hay đường uống ngắn ngày. Trong trường hợp này, điều trị đường dùng tại chỗ 7-14 ngày hoặc *Fluconazole 150mg 2 liều liên tiếp cách nhau 72h* được khuyến cáo.

22

VIÊM ÂM HỘ, ÂM ĐẠO DO NẤM

- **Nhiễm Candida nonalbicans**
- Lựa chọn đầu tay: Điều trị dài ngày hơn (7-14 ngày) với một thuốc nhóm azole (trừ fluconazole) đường uống hoặc đường dùng tại chỗ.
- Trường hợp tái phát: 600mg acid boric dạng viên gelatin đặt âm đạo 1 lần/ngày trong 2 tuần.

23



24

IV. KẾT LUẬN

- Thực hiện tốt quy chế kê đơn
- Một số vấn đề lưu ý:
 - Sử dụng thuốc điều trị viêm âm đạo
 - Sử dụng Fluconazole 150mg trong trường hợp viêm âm hộ, âm đạo do nấm Candida

Chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi!

